



WERT Boro

WERT Boro é um fertilizante foliar líquido desenvolvido para fornecer Boro altamente assimilável às culturas agrícolas. Sua formulação à base de Ácido Bórico garante rápida absorção e mobilidade, atendendo às necessidades fisiológicas das plantas em fases críticas, como brotamento, floração, frutificação e formação de grãos.

O Boro é um micronutriente essencial, diretamente ligado ao transporte de açúcares, divisão celular, desenvolvimento reprodutivo e qualidade de frutos, sendo indispensável para altos níveis de produtividade e qualidade final da colheita.

Composição Garantida

Ácido Bórico (Boro solúvel em água): 10%

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

- Formulação líquida de alta solubilidade e rápida absorção foliar.
- Alta concentração de Boro solúvel
- Formulação líquida estável, prática e segura de aplicar
- Compatível com a maioria dos fertilizantes e defensivos agrícolas
- Favorece maior eficiência quando aplicado em fases críticas de desenvolvimento

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Melhora o pegamento das flores e a formação de frutos
- Favorece o enchimento de grãos e a qualidade dos frutos
- Estimula a germinação do pólen e o crescimento do tubo polínico
- Aumenta a eficiência da fotossíntese e do transporte de açúcares
- Reduz problemas de abortamento floral e rachaduras de frutos
- Promove maior produtividade e qualidade de colheita.

BENEFÍCIOS DOS NUTRIENTES E ADITIVOS

Componente	Função Agronômica
Boro (10%)	Essencial para divisão e diferenciação celular, floração, frutificação, transporte de açúcares e desenvolvimento de tecidos vegetais.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cultura	Dosagem Recomendada (L/ha)	Época de Aplicação
Soja	0,5 – 1,0	Pré-floração e enchimento de grãos
Milho	0,5 – 1,0	Pré-pendoamento e início do enchimento de grãos
Trigo/Cevada	0,5 – 0,8	Emborrachamento e início da formação de grãos
Feijão	0,5 – 0,8	Pré-floração e vagens iniciais
Algodão	0,8 – 1,0	Formação dos botões florais e início da frutificação
Café	1,0 – 2,0	Antes da florada e na frutificação
Citros	1,5 – 2,0	Brotação ativa, antes da florada e no pegamento dos frutos



Uva	0,8 – 1,0	Pré-florada e início de frutificação
Hortaliças	0,5 – 0,8	Durante o desenvolvimento vegetativo e início da frutificação
Tabaco	0,5 – 0,8	Fase de desenvolvimento vegetativo e antes do florescimento

MODO DE APLICAÇÃO

Pulverização foliar com cobertura uniforme. Reaplicações podem ser realizadas conforme necessidade nutricional da cultura ou sob recomendação técnica.

Via foliar com pulverizador costal, tratorizado ou por drones agrícolas.

COMPATIBILIDADE

Fazer teste de compatibilidade antes da mistura com outros produtos. Produto compatível com a maioria dos defensivos e adjuvantes.

Aplicar preferencialmente nas horas mais frescas do dia (manhã ou fim da tarde).

PRECAUÇÕES E ARMAZENAMENTO

Usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) durante a aplicação.

Agitar antes de usar.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar direta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nome	TOOR Boro
Garantias Solúveis em água	Boro (B) 10%p/p (105g/L)
Número do Registro	RS 003997-7.000011
Tipo	Fertilizante Mineral Simples – Borato de monoetanolamina
Recomendação	Aplicar durante o cultivo, quando a planta necessitar do produto
Natureza Física	Fluído/ Solução Homogênea
Maior Relação Soluto/ Solvente	20mL.L ¹
Densidade	20°C 1,32g/mL
Uso	Foliar
Composição	Água, Ácido bórico, monoetanolamina

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 L / 5 L / 20 L / 1000 L (IBC)