



WERT PK

WERT PK é um fertilizante foliar de alta performance, formulado com potássio solúvel (26% K₂O), que atua de forma estratégica no desenvolvimento e na defesa das plantas. Sua formulação líquida permite rápida absorção e translocação, oferecendo resultados visíveis em curto prazo.

A presença do fosfito de potássio confere ao produto uma dupla ação: além de suprir nutrientes essenciais, estimula os mecanismos naturais de defesa da planta, promovendo resistência induzida a doenças fúngicas como Phytophthora e Pythium. O potássio, por sua vez, potencializa o metabolismo, favorecendo a fotossíntese, o enchimento de grãos e frutos e a tolerância ao estresse abiótico.

Sua aplicação regular nas culturas proporciona maior vigor vegetativo, sanidade das plantas, melhor formação de raízes, frutos e sementes, além de incremento direto na produtividade e qualidade final da colheita. Indicado para diversas culturas, WERT PK é uma ferramenta versátil e eficaz no manejo nutricional e fitossanitário moderno.

COMPOSIÇÃO GARANTIAS SOLUVEIS EM ÁGUA

Potássio (K₂O) 26% p/p (382,2g/L)

BENEFÍCIOS GERAIS

- Promove o crescimento radicular e vigor vegetativo.
- Favorece o enchimento de grãos, frutos e tubérculos.
- Auxilia na tolerância ao estresse abiótico (seca, salinidade, frio).

BENEFÍCIOS DOS NUTRIENTES

Componente	Função Agronômica
Potássio (K ₂ O)	Regula a abertura estomática, melhorando a eficiência do uso da água. Favorece o transporte de açúcares e síntese de proteínas. Aumenta a qualidade dos frutos, firmeza e conservação pós-colheita. Importante para a formação de amido e o crescimento de órgãos de reserva.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cultura	Dose (L/ha)	Época de Aplicação
Soja	1,0 – 2,0	V4 a R2 (vegetativo ao florescimento)
Milho	1,0 – 2,0	V4 a V10 (vegetativo) e pendoamento
Feijão	1,0 – 2,0	Antes e após o florescimento
Trigo/Cevada	1,0 – 2,0	Perfilhamento e pré-espigamento
Café	2,0 – 3,0	Após florada e durante enchimento de frutos
Citros	2,0 – 3,0	Brotações e frutificação
Videira	1,5 – 3,0	Início da brotação até início da maturação
Batata dos tubérculos	2,0 – 3,0	Início da tuberização e durante o enchimento
Tomate/Pimentão	1,5 – 2,5	Crescimento vegetativo e início da frutificação
Folhosas (alface, couve)	1,0 – 1,5	A cada 10 a 15 dias após o transplante



Frutíferas em geral	2,0 – 3,0	Pré e pós-florada, frutificação e maturação
---------------------	-----------	---

MODO DE APLICAÇÃO

Pulverização foliar com cobertura uniforme. Reaplicações podem ser realizadas conforme necessidade nutricional da cultura ou sob recomendação técnica.

Via foliar com pulverizador costal, tratorizado ou por drones agrícolas.

COMPATIBILIDADE

Fazer teste de compatibilidade antes da mistura com outros produtos.

Não aplicar em horários de alta insolação ou com risco de chuva iminente.

PRECAUÇÕES DE USO

Usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) durante a aplicação.

Agitar antes de usar.

Armazenar em local seco, ventilado e ao abrigo da luz solar direta.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nome	WERT PK
Garantias Solúveis em água	Potássio (K ₂ O) 26% p/p (382,2g/L)
Número do Registro	RS 003997-7.000006
Tipo	Fertilizante mineral misto
Recomendação	Aplicar durante o cultivo, quando a planta necessitar do produto
Natureza Física	Fluído/ Solução
Maior Relação Soluto/Solvente	30g/L ¹ - CONSIDERANDO UMA VAZÃO DE 100L
Densidade	20°C 1,47g/mL
Via de aplicação	Foliar
Composição	Água, Ácido Fosforoso, Hidróxido de Potássio

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 L / 5 L / 20 L / 1000 L (IBC)